


インフルエンザ 集団 予防接種



予約受付開始

予約期間

9/10 (木) ~ 9/25 (金)

予約方法

①電話 ☎78-2023 (平日 13:30~17:00)

②ネット <https://logoform.jp/form/VXoQ/1635249>



※①②どちらかでお申し込みください。保育園や学校を通しての受付は行いませんのでこちらでご予約ください

集団接種料金 (自己負担額)

村民限定
特別料金

- 1歳~12歳 ▶ 無料 (村が全額助成)
- 13歳~18歳 ▶ 無料 (村が全額助成)
- 19歳~64歳 ▶ **3,700 円**
- 65歳~ ▶ **1,000 円** 医師が必要と認めた場合は2回

12歳以下の
接種回数は
2回です

個別接種料金 (集団接種日以外)

※助成期間は R8. 10. 1 ~ R9. 1. 31

- ▶ 無料 (村が全額助成※)
- ▶ 無料 (村が全額助成※)
- ▶ **4,800 円**
- ▶ **1,500 円** (村が残額助成※)

接種場所

東白川村国保診療所 (五加下野)

接種日時

1回目 **10/16 (金)** 2回目 **11/12 (木)**

接種時間は
14:30~17:00
個別に通知します

◆**集団接種料金**は、上記2日間に限ります。この機会にご予約ください。予約済でも別日に接種した場合は**個別接種料金**(例: 65歳以上は1,500円)になりますのでご理解ください。

◆接種日時の案内文と予診票を、10月上旬に郵送でお届けします。「接種の指定日時」にお越しく下さい。

◆昼のつちのこバス、17:15着の濃飛バスに合わせた接種時間を別に設定します。あわせてご利用ください。

◆つちのこバスの利用が難しいという方は、別の日に個別接種で対応します。電話でご相談ください。

お問合せ先 東白川村国保診療所 ☎78-2023

予防接種を受ける前の一般的注意事項

インフルエンザ予防接種は、自らの意思で接種を希望される方に限って実施いたします。下記事項をお読みいただき、必要性や副反応について十分にご理解いただいたうえで、お申し込み・接種を受けてください。

後日、郵送でお届けする「**予診票**」は責任をもって、もれのないよう記入してください。

予防接種を受けることが出来ない人

- ①接種当日、明らかに発熱のある人。（一般的に体温が **37.5℃**以上の発熱）
- ②重篤な急性疾患にかかっている人。
- ③インフルエンザワクチンに含まれる成分によって、アナフィラキシーショックを起こしたことがある人。
※アナフィラキシーとは、通常接種後 30 分以内に起こるひどいアレルギー反応のこと
- ④以前にインフルエンザ予防接種を受けた時、2 日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを思わせる症状があった人。
- ⑤その他、医師が不適当な状態と判断した場合。
※上の①～④に入らなくても医師が接種不適当と判断した場合は接種を受けられません。

予防接種を受けるに際し、主治医とよく相談することが必要な人

- ①心臓・腎臓・呼吸器の機能に自己の身の日常生活が極度に制限される程度の障害を有する人。
- ②ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人。
- ③他の医療機関で治療中・経過観察中の病気があるは、主治医にインフルエンザ予防接種を受けることについての意見を聞いておいてください。
- ④重篤な卵アレルギーのある人は、主治医・接種医師と十分相談してください。

予防接種を受けるまでに期間をあけることが必要な人

- ①最近、ウイルス性疾患等に罹患した場合は、間隔をあけることが必要な場合もあります。
（注意）自分が当てはまると思う人は診療所へお問い合わせください。

予防接種を受けたあとの一般的な注意事項

- ①予防接種を受けた後 24 時間は副反応の出現に注意し、体調にご注意ください。特に接種直後 30 分以内は、急な副反応が起こることがあるので、医師とすぐに連絡がとれるようにしましょう。
- ②接種当日は普段通りに生活しても構いませんが激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ③インフルエンザは不活化ワクチンですので、ウイルス自体は化学的に処理され病原性はないので、その予防接種によってインフルエンザになることはありません。

予防接種の副反応

- ①重大な副反応
ショック・アナフィラキシー様症状（じんましん・呼吸困難・血管浮腫等）があらわれることがあり、そのほとんどは、接種後 30 分以内に生じます。
- ②その他の副反応
過敏症：まれに接種直後から数日中に、発疹・じんましん・紅斑・掻痒等があらわれることがあります
全身症状：発熱・悪寒・頭痛・倦怠感等を認めることがあります。通常 2～3 日中に消失します
局所症状：接種部位の発赤・腫脹・痛み等を認めることがあります。通常 2～3 日中に消失します

※1 歳未満のお子さんについては、接種を行っても十分な免疫をつけることは難しいと思われませんが、保護者が強く希望される場合は、上記予約期間に電話にて予約してください。（接種費用の助成はありません。）

※気にかかることや、不明な点があれば、診療所にお気軽にご相談ください。